

6. Ratkaise differentiaaliyhtälö

$$x' = tx^2, \quad x(0) = 1$$

numeerisesti aikavälillä  $0 \leq t \leq 1$

- (a) Eulerin menetelmällä, askelpituus  $h = 0.25$ .
- (b) Parannellulla Eulerilla, askelpituus  $h = 0.5$ .
- (c) Runge-Kutalla, askelpituus  $h = 1$ .

Esitä tulokset (yhtenä tai useampana) taulukkona, jossa selkeästi  $t^{(k)}$ :t ja  $x^{(k)}$ :t.

### Laplace-muunnoksiin liittyviä kaavoja

Annettu  $f(t)$ , merkitään  $F = \mathcal{L}f$ , eli  $F(s) = \int_0^\infty \dots (?) \dots dt$ .

$$(\mathcal{L}f')(s) = sF(s) - f(0), \quad (\mathcal{L}f'')(s) = s^2F(s) - sf(0) - f'(0),$$

$$(\mathcal{L}f^{(n)})(s) = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - \dots - sf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0),$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\}(s) = \frac{1}{s}F(s),$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}(s) = F(s-a), \quad \mathcal{L}(f(at))(s) = \frac{1}{a}\mathcal{L}f(s/a).$$

### Muunnoksia:

$f(t)$	$F(s)$
1	$1/s$
$t^n$	$n!/s^{n+1}$
$e^{at}$	$1/(s-a)$
$\sin \omega t$	$\omega/(s^2 + \omega^2)$
$\cos \omega t$	$s/(s^2 + \omega^2)$
$\sinh at$	$a/(s^2 - a^2)$
$\cosh at$	$s/(s^2 - a^2)$

**Numeerisia menetelmiä** yhtälölle  $x' = F(x, t)$ :

- Euler:  $x^{(k)} = x^{(k-1)} + hF(x^{(k-1)}, t^{(k-1)})$ .
- Implisiittinen Euler:  $x^{(k)} = x^{(k-1)} + hF(x^{(k)}, t^{(k)})$ .
- Paranneltu Euler:  $x^{(k)} = x^{(k-1)} + \frac{h}{2}(c_1 + c_2)$ , missä

$$c_1 = F(x^{(k-1)}, t^{(k-1)}),$$

$$c_2 = F(x^{(k-1)} + hc_1, t^{(k-1)} + h).$$

- Runge-Kutta:  $x^{(k)} = x^{(k-1)} + \frac{h}{6}(c_1 + 2c_2 + 2c_3 + c_4)$ , missä

$$c_1 = F(x^{(k-1)}, t^{(k-1)}),$$

$$c_2 = F(x^{(k-1)} + \frac{1}{2}hc_1, t^{(k-1)} + \frac{1}{2}h),$$

$$c_3 = F(x^{(k-1)} + \frac{1}{2}hc_2, t^{(k-1)} + \frac{1}{2}h),$$

$$c_4 = F(x^{(k-1)} + hc_3, t^{(k-1)} + h).$$