

MS-A0301 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3

Kurssitentti ja yleinen tentti 19.4.2023 klo 9.00–12.00.

Kokeessa ei saa käyttää laskimia eikä taulukoita. Täytä kaikki otsaketiedot kaikkiin vastauspapereihin.

Kurssitentti: Viisi parasta tehtävää otetaan mukaan arvosteluun.

Yleinen tentti: Laske kaikki kuusi tehtävää.

Jokainen kurssille IV/2023 osallistunut voi halutessaan yrittää kuutta tehtävää, jolloin arvostana määräytyy paremman vaihtoehdon mukaan: "viisi parasta koetettavaa + laskaripisteet" tai "pelkät kuusi koetettavaa".

1. Pallon

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$$

lämpötila  $T$  riippuu pallokoordinaatiston muuttujasta  $r$  niin, että ytimestä  $0 < r < 1$  lämpötila on 30 ja kuorella  $1 < r \leq 2$  lämpötila on 6. Laske pallon keskilämpötila

$$\bar{T} = \frac{1}{V} \iiint_B T \, dV.$$

Pallon tilavuus  $V = 4\pi \cdot 2^3/3$  oletetaan tunnetuksi.

Tarpeeton lisätieto: Jos lämpötilajakauma hetkellä  $t = 0$  on kuvauksen mukainen ja pallon pinta täysin eristetty ulkomaailmasta, niin koko pallon lämpötila lähestyy ajan kuluessa tasapainolämpötilää  $\bar{T}$ .

2. Määritä vektorikentän  $\mathbf{F}(x, y) = 2xi + 4yj$  viivaintegraali pisteestä  $(2, 0)$  pisteeseen  $(-2, 0)$  pitkin ellipsin  $x^2/4 + y^2 = 1$  ylemmässä puolitasossa  $y \geq 0$  kulkevaa kaarta pitkin.

3. Määritä vektorikentän  $\mathbf{F}(x, y) = i - 2xyj$  kenttäviivojen yhtälöt ja hahmottele kuvion ainakin kolme eri kenttäviivaa. Kuvion mittakaavasta ei tarvitse välittää.

4. Vektorikenttä

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x + axy + z)i + (x^2 - y^2)j + (bx - cz)k$$

tiedetään lähteettömäksi ( $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ ) ja pyörteettömäksi ( $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ) koko avaruudessa.

a) Määritä vakioiden  $a, b$  ja  $c$  arvot.

b) Kun vakiot  $a, b$  ja  $c$  kiinnitetään a-kohdan mukaisesti, niin yleisen teorian perusteella vektorikentällä  $\mathbf{F}$  on sekä skalaari- että vektoripotentiaali. Määritä näistä jompikumpi.

5. Laske vektorikentän

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x^3i + y^3j + z(3 - z)k$$

vuon pinnan  $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq 3\}$  läpi Gaussin lauseen avulla, kun (sylinterin vaippa)  $S$  on ensin täydennetty umpinaiseksi pinnaksi niin, että  $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 0$  täydennetyillä osilla. (Nämä ehdot täyttyvät myös todentaa laskuilla.)


6. Luennoitsija yritti keksiä tenttiin sopivaa pintaa, mutta päätyi rauskun (?) prototyypin, jolla on parametrisointi

$$\mathbf{r}(u, v) = (u + \sin v, v + \sin u, u + v),$$

kun parametrialueena on neliö  $\Omega = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq \pi, 0 \leq v \leq \pi\}$ .

- Määritä rauskun keskipisteen (joka vastaa parametrien arvoja  $u = v = \pi/2$ ) normaalivektori ja pinta-alan paikallinen suurennessuhde tässä pisteessä. (4 p.)
- Kuvion perusteella näyttää siltä, että rauskun pyrstön päässä parametrisoinnin avulla muodostetut tangenttivektorit eivät ole lineaarisesti riippumattomat. Perustele tämä väite laskujen avulla. (2 p.)

Huom: Kuvaa on kierretty, joten normaalin suuntaa ei voi tarkistaa kuvasta.



Eräitä kaavoja:

- $\frac{dx}{F_1(x, y)} = \frac{dy}{F_2(x, y)}$
- $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 \leftrightarrow x = a \cos t, y = b \sin t$
- $\nabla \cdot (a\mathbf{F} + b\mathbf{G}) = a\nabla \cdot \mathbf{F} + b\nabla \cdot \mathbf{G}, \nabla \times (a\mathbf{F} + b\mathbf{G}) = a\nabla \times \mathbf{F} + b\nabla \times \mathbf{G}, a, b \in \mathbf{R}$
- $\nabla \cdot (\nabla f) = \Delta f, \nabla \times \nabla f = \mathbf{0}, \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) = 0$
- $\nabla \cdot (f\mathbf{F}) = \nabla f \cdot \mathbf{F} + f(\nabla \cdot \mathbf{F}), \nabla \times (f\mathbf{F}) = \nabla f \times \mathbf{F} + f(\nabla \times \mathbf{F})$
- $\bar{x} = \frac{1}{A} \iint x \, dA, \bar{y} = \frac{1}{A} \iint y \, dA$
- $\oint_{\partial D} F_1 \, dx + F_2 \, dy = \iint_D \left( \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dA$
- Tällä kurssilla  $\mathbf{n} = \text{yksikkönormaali}$ .
- $\iiint_D \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV = \iint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$
- $\iint_P (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \oint_{\partial P} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{\partial P} F_1 \, dx + F_2 \, dy + F_3 \, dz$
- $(r, \varphi, \theta): x = r \sin(\varphi) \cos(\theta), y = r \sin(\varphi) \sin(\theta), z = r \cos(\varphi), dV = r^2 \sin(\varphi) \, dr \, d\varphi \, d\theta$
- $(r_\perp, \theta, z): x = r_\perp \cos(\theta), y = r_\perp \sin(\theta), z = z, dV = r_\perp \, dr_\perp \, d\theta \, dz$
- $\sin(\pi/6) = \cos(\pi/3) = 1/2, \sin(\pi/3) = \cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2, \sin 0 = \cos(\pi/2) = 0,$   
 $\sin(\pi/2) = \cos 0 = 1, \sin \pi = 0, \cos \pi = -1, \sin^2 x + \cos^2 x = 1, \sin(2x) = 2 \sin x \cos x,$   
 $\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x.$

Huom. 1: Kurssin palautekyselyyn vastaamisesta saa yhden koepisteen!

Huom. 2: Kurssitenttiin voi uusia seuraavaan tenttiin yhteydessä. Myös uusijoiden täytyy ilmoittautua tenttiin.