

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
Matematiikan ja systeemianalyysin laitos

MS-A0204 Differentiaali- ja integraalilaskenta 2

Alestalo/Abuzaid

Kurssitentti ja yleinen tentti 19.2.2024 klo 9.00–12.00.


Kokeessa ei saa käyttää laskimia eikä erillisiä taulukkokirjoja tai muistiinpanoja.

Kurssitentti: Viisi parasta tehtävää otetaan mukaan arvosteluun.

Yleinen tentti: Laske kaikki kuusi tehtävää.

Kaikki periodin III/2024 luentokurssille osallistuneet voivat halutessaan laskea kuusi tehtävää, jolloin arvosana määräytyy paremman vaihtoehdon mukaan: ”viisi parasta koetehtävää + laskaripisteet” tai ”pelkät kuusi koetehtävää”.

1. Parametrisoitu tasokäyrä $x = t^2$, $y = t - t^3$, muistuttaa kreikkalaista α -kirjainta, kun $-1,15 \leq t \leq 1,15$, vrt. kuvio.
 - a) Määritä α -käyrän ”huippukohdan” (merkitty kuvioon) x -koordinaatti.
Vihje: Huippukohdassa käyrän tangenttivektori on vaakasuora.
 - b) Käyrä leikkaa itseään parametrien arvoilla $t = \pm 1$. Tutki, onko leikkaus kohtisuora, eli ovatko näillä kahdella parametrien arvolla lasketut tangenttivektorit kohtisuorassa toisiaan vastaan.
 - c) Muodosta integraalilauseke, joka esittää α -käyrän silmukan kaarenpituutta. Integraalin arvoa ei tarvitse laskea, mutta vastauksessa täytyy näkyä integroitava funktio ja integroinnin rajat.



2. a) Onko funktiolla

$$f(x, y) = \frac{x^2 + 2y^2}{2x^2 + y^2}$$

raja-arvoa origossa $(0, 0)$? Määritä raja-arvo, jos se on olemassa.

b) Määritä funktion $g(x, y) = x^3 + x^2 + 2xy - 3x + y^2$ kriittiset pisteet eli yhtälöparin $\nabla g = \vec{0}$ ratkaisut.

3. Muodosta yhtälön $y^5 + xy + x^2 = 13$ määräämän tasokäyrän tangenttisuora käyrän pisteessä $(3, 1)$.

Vihje: Välvaiheissa voi käyttää joko implisiittistä derivointia tai gradienttia.


4. Määritä ellipsin $x^2 + 3y^2 - 2xy = 6$ korkein ja matalin kohta etsimällä funktion $f(x, y) = y$ suurin ja pienin arvo sopivan sidosehdon vallitessa.
5. Kolmion K kärjet ovat pisteissä $(0, 0)$, $(2, 0)$ ja $(2, 4)$. Laske tasointegraali

$$\iint_K (6x^2 - 3y^2) dA.$$

6. Miljonääri valmistuttaa lemmikilleen kultaisen ruokakupin, jonka muotoa kuvaa (sopivissa yksiköissä)

$$0 \leq z \leq \sin(x^2 + y^2), \text{ kun } x^2 + y^2 \leq \pi.$$

Laske kultaisen osan tilavuus taso- tai avaruusintegraalin avulla.



Lisätieto: Eräitä trigonometrinen funktioiden arvoja:

α	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin(\alpha)$	$-1/\sqrt{2}$	$-1/2$	0	$1/2$	$1/\sqrt{2}$	$\sqrt{3}/2$	1	0
$\cos(\alpha)$	$1/\sqrt{2}$	$\sqrt{3}/2$	1	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{2}$	$1/2$	0	-1
$\tan(\alpha)$	-1	$-1/\sqrt{3}$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	$-$	0

Muita kaavoja ilman selityksiä:

- $ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac})/2a$
- $dA = dx dy = dy dx = r dr d\theta$

Huom. 1: Kurssin palautekyselyyn vastaamisesta saa yhden koepisteen!

Huom. 2: Kurssitentti voi uusua kevään/kesän tenttiin yhteydessä, jolloin laskaripisteet otetaan huomioon ja parempi tulos jää voimaan. Myös uusintaan osallistuvien täytyy ilmoittautua tenttiin.