

$$\text{a)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}, \quad \text{b)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n, \quad \text{c)} \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}.$$

Tentti ja välkoeuusimmat 12.1.2007.

Täytyä huolellisesti kaikki vaaditut tiedot jokaiseen vastauspaperiin.
Ei laskimia eikä taulukoita!

Välkokeet 3 tuntia, tentti 4 tuntia.

Välkkoe 1: teht. 1-4. Välkkoe 2: teht. 5-8. Välkkoe 3: teht. 9-12.

Tentti: teht. I = 3, II = 4a + 5a, III = 6a + 7b, IV = 10, V = 11b + 12a.

1. a) Määritä differentiaaliyhälön $y' + 2y = 6$ yleinen ratkaisu.
b) Ratkaise alkuarvot tehtävä $y'' + 3y' - 4y = 8$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$.

2. Kolmion kärjet ovat pisteissä (x_1, y_1) , (x_2, y_2) ja (x_3, y_3) . Määritä vektorilaskennan avulla kolmion kahden keskijanan (mediaanin) leikkauspisteen koordinaatit. Kyseiset kaksi keskijanaa voi valita vapaaasti.

3. Lento Pietarista P = (60° N, 30° E) Sydneyhin S = (30° S, 150° E) seuraa lyhyintä mahdollista reittiä, eli Maan pintaan ($r = 1$) pisteiden O = origo = Maan keskipiste, P ja S määräಮäässä tasossa. Missä kohdassa lentokone ylittää päiväntasaajan? Vastauksen voi antaa muodossa $\tan \varphi = \text{luku}$.
Paikavekttorin lauseke

$$\vec{e}_r = \sin \theta \cos \varphi \vec{i} + \sin \theta \sin \varphi \vec{j} + \cos \theta \vec{k}$$

oletetaan tunnetuksi.

4. Olkoot $a, b > 0$.

- a) Kirjoita $a + ib$ polaarimuodossa $r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$.
b) Laske $(a + ib)(\cos(\omega t) + i \sin(\omega t))$ ja päättele polaarimuotoja tutkimalla vakiot A ja δ kaavassa $a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t) = A \sin(\omega t + \delta)$.

5. Osoita induktiolla, että

a) kaikilla $n \in \mathbb{N}$ pätee $\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$.

- b) jos $a_0 = 0$ ja $a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$ kaikilla $n \geq 0$, niin $a_n \leq 2$ kaikilla n .

6. a) Esitä Cauchy-jonon määritelmä ja osoita määritelmää lähtien, että jokaainen Cauchy-jono on rajoitettu.
b) Olkoon $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ aidosti kasvava reaalilukujono. Pitääkö paikkansa:

Provet på svenska: Vänd!

on olemassa $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbf{R} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$?

7. Tutki seuraavien sarjojen suppenemista; keskimmäistä kaikilla $x \in \mathbb{R}$:

- a) Määrittele jokin bijektio $f: (0, \infty) \rightarrow (0, 1)$. Tunnitujia alkiesimfunkcioita saa käyttää, mutta bijektiivisyyys täytyy perustella.

- b) Muodosta jokin parametrisointi sellaiselle käyrälle, joka yhdistää pisteen $(1, 0, 1)$ ja $(0, 1, -1)$ pitkin pallopintaa $x^2 + y^2 + z^2 = 2$; ts. käyrä sisältyy ko. pallopinnalle ja sillä on annetut alku- ja loppupisteet.

8. a) Muotoile "Differentiaalilaskun väliarvolause" (eli toinen väliarvolause) ja esitä sen todistus. Tarvittavia apuloksia ei tarvitse todistaa.

9. Muotoile "Tarkastellaan parametrisoitua tasokäyrää $x = \cos t$, $y = \sin(2t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, joka muistuttaa ∞ -merkkiä.

- a) Käyrä leikkaa itsään origossa (parametrin arvo $t = \pi/2$ ja $t = 3\pi/2$). Määritä vastaavien tangentivektoreiden välinen kulma $\alpha \in [0, \pi/2]$.
b) Millä parametrin $t \in [0, \pi/2]$ arvolla piste $(x(t), y(t))$ on kauimpana origosta?

10. Tarkastellaan parametrisoitua tasokäyrää $x = \cos t$, $y = \sin(2t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, joka muistuttaa ∞ -merkkiä.
- a) Osoita, että yhtiöllä $x^3 + x - 1 = 0$ on yksikäsittinen ratkaisu alueessa $x > 0$.
b) Selitä lyhyesti Newtonin iteraatiomenetelmä ja sovela sitä a-kohdan yhtälöön (kaksi askelta ja sopiva alkuarvo).

11. a) Määritä raja-arvo $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$.
b) Olkoon $b > 0$. Laske raja-arvo $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.
Miten tulos liittyy yhtälön $ax^2 + bx + c = 0$ ratkaisuihin?

Lisätieto: Esitä trigonometristen funktioiden arvoja:

$$\begin{bmatrix} \alpha & 0 & \frac{\pi}{6} & \frac{\pi}{3} & \frac{\pi}{2} & \frac{2\pi}{3} & \frac{5\pi}{6} & \pi & \frac{7\pi}{6} & \frac{4\pi}{3} & \frac{3\pi}{2} & \frac{5\pi}{3} & \frac{11\pi}{6} & 2\pi \\ \sin \alpha & 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -1 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \\ \cos \alpha & 1 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -1 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 &end{bmatrix}$$

Mellanförhör 3 timmar, tentamen 4 timmar.

Mellanförhör 1: prob. 1-4. **Mellanf. 2:** prob. 5-8. **Mellanf. 3:** prob. 9-12.

Tentamen: I = 3, II = 4a + 5a, III = 6a + 7b, IV = 10, V = 11b + 12a.

1. a) Bestäm den allmänna lösningen till differentialekvationen $y' + 2y = 6$.
b) Lös begynnelsevärdesproblemet $y'' + 3y' - 4y = 8$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$.
 2. Spetsarna hos en triangel ligger i punkterna (x_1, y_1) , (x_2, y_2) och (x_3, y_3) . Använd vektorkalkyl för att bestämma koordinaterna för korsningspunkten mellan två medianer (som kan väljas fritt).
 3. Ett flyg från St. Petersburg P = $(60^\circ \text{ N}, 30^\circ \text{ E})$ till Sydney S = $(30^\circ \text{ S}, 150^\circ \text{ E})$ följer den kortaste rutten, dvs. jordens yta ($r = 1$) i det planet som innehåller punkterna O = origo = jordens mittpunkt, P och S. I vilket ställe korsar rutten ekvatoren? Svaret kan ges på formen $\tan \varphi = \text{värdet}$. Enhetsvektorn
- $$\vec{e}_r = \sin \theta \cos \varphi \vec{i} + \sin \theta \sin \varphi \vec{j} + \cos \theta \vec{k}$$
- antas känd.
4. Låt $a, b > 0$.
 - Skriv $a + ib$ på polära formen $r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$.
 - Beräkna $(a + ib)(\cos(\omega t) + i \sin(\omega t))$ och lös ut konstanterna A och δ i formeln $a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t) = A \sin(\omega t + \delta)$ med hjälp av undersöknings av polära former.
 5. Visa med hjälp av induktion att
 - för alla $n \in \mathbb{N}$ gäller $\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$.
 - om $a_0 = 0$ och $a_{n+1} = \sqrt{2+a_n}$ för alla $n \geq 0$, så är $a_n \leq 2$ för alla n .
 6. a) Ge definitionen av en Cauchy-följd och visa med dess hjälp att varje Cauchy-följd är begränsad.
b) Låt $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vara en strängt växande följd av reella tal. Gäller det att:
- $$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \in \mathbb{R} \text{ existerar} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0?$$

7. Undersök konvergensen av följande serier; den mellersta för alla värden av $x \in \mathbb{R}$:

$$\text{a)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}, \quad \text{b)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n, \quad \text{c)} \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}.$$

8. a) Definiera någon bijektion $f: (0, \infty) \rightarrow (0, 1)$. Kända elementärfunktioner- na får användas, men bijektiviteten måste motiveras.
b) Bilda en parametrisering för en sådan kurva, som förbindar punkterna $(1, 0, 1)$ och $(0, 1, -1)$ längs den sfäriska ytan $x^2 + y^2 + z^2 = 2$; dvs. kur- van innefattas på den här sfäriska ytan och har den givna begynnelse- och slutpunkten.
9. Ge formuleringen av "Differentialkalkylens medelvärdessats" (den andra me- delvärdessatsen) och presentera dess bevis. De behövliga hjälpproblemena be- höver inte bevisas.
10. Vi betraktar en parametriserad plan kurva $x = \cos t$, $y = \sin(2t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, som liknar symbolen ∞ .
 - Kurvan korsar sig själv i origo (med parametrerna $t = \pi/2$ och $t = 3\pi/2$). Bestäm vinkeln $\alpha \in [0, \pi/2]$ mellan de motsvarande tangentvektoreerna.
 - Vid vilket parametervärdé $t \in [0, \pi/2]$ ligger punkten $(x(t), y(t))$ längst bort från origo?
11. a) Visa att ekvationen $x^3 + x - 1 = 0$ har en entydig lösning i området $x > 0$.
b) Förklara kort Newtons iterationsmetod och tillämpa den på ekvationen i del a) (två steg med ett passande begynnelsevärdé).
12. a) Bestäm gränsvärdet $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$.
b) Låt $b > 0$. Beräkna gränsvärdet $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.
Hur sammankänner resultatet med lösningarna av ekvationen $ax^2 + bx + c = 0$?

Extra information: Några värden av trigonometriska funktioner:

$$\begin{bmatrix} \alpha & 0 & \frac{\pi}{6} & \frac{\pi}{3} & \frac{\pi}{2} & \frac{2\pi}{3} & \frac{5\pi}{6} & \pi & \frac{7\pi}{6} & \frac{4\pi}{3} & \frac{3\pi}{2} & \frac{5\pi}{3} & \frac{11\pi}{6} & 2\pi \\ \sin \alpha & 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -1 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \cos \alpha & 1 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -1 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \end{bmatrix}$$